инсектоакарицидное и
педикулицидное средство
перметрин 25% + синергисты, КЭ

АКРОМЕД·У

предназначен для:

- уничтожения тараканов, муравьев, клопов, блох, мух, комаров и крысиных клещей;
- уничтожения головных и лобковых вшей, гнид у взрослого населения и детей с 5 лет, уничтожения платяных вшей;
- дезинсекции помещений против вшей и чесоточных клещей в том числе в ЛПУ и очагах педикулёза и чесотки.

для применения персоналом организаций, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью, а также населением в быту

ПРИМЕНЕНИЕ

уничтожение бытовых насекомых: рабочую эмульсию нанести из распылителя на поверхности в местах обнаружения, перемещения или выплода насекомых (вент. короба, антресоли, плинтуса, дверные и оконные короба, места прокладки труб водо- и теплоснабжения, пол, наружные и внутренние стены строений, мусорные камеры, выгребные ямы и пр.)

приготовление рабочей эмульсии для борьбы с бытовыми насекомыми (на 1 л воды):

Объект обработки	Кол-во препарата
тараканы, мухи личинки	10,0 мл
муравьи, клопы, блохи, мухи имаго, комары имаго	5,0 мл
комары личинки	2,0 мл

уничтожение головных и лобковых вшей: рабочую эмульсию нанести тампоном на волосы головы или других частей тела (при наличии лобковых вшей). Через 20 минут после нанесения средство смыть проточной водой, затем вымыть волосы обычным способом с применением мыла или шампуня. Удалить погибших насекомых и гнид. Норма расхода рабочей эмульсии составляет от 30 до 100 мл в зависимости от степени зараженности насекомыми, длины и густоты волос. При необходимости повторить обработку через 7-10 дней.

уничтожение плятяных и чесоточных клещей: обработать предметы одежды и постельные принадлежности всех совместно проживающих проживающих лиц. Для этого применяют два метода: замачивание зараженных вещей или орошение их при помощи распыливающей аппаратуры. Изделия, подлежащие стирке, замачивают в рабочей эмульсии в течение 20 минут. Норма расхода рабочей эмульсии на комплект нательного белья составляет 2,5л и 4,5л на комплект постельного белья (или на 1 кг сухих вещей). После дезинсекции белье тщательно прополаскивают и замачивают на 1 час в горячем мыльно-содовом растворе (1 ст. ложка кальцинированной соды и 5 г хозяйственного мыла на 1 л воды), после чего стирают обычным способом.

Не подлежащую стирке верхнюю одежду, постельные принадлежности и прочие вещи орошают рабочей эмульсией, нанося на всю поверхность обрабатываемых вещей. Одеяла, подушки, матрасы и одежду подвергают двусторонней обработке. Особое внимание следует уделять швам и складкам на внутренней стороне одежды. Норма расхода на платье из шерсти составляет 30-50 мл; на комплект постельных принадлежностей (матрас, одеяло) - 400 мл; на комплект одежды (пальто, пиджак, брюки, шапка) - 350 мл. Обработанными вещами пользуются только после их просушки и проветривания на открытом воздухе в течение дня.

приготовление рабочей эмульсии для борьбы с педикулезом (на 1 л воды):

Объект обработки	Кол-во препарата
головные, лобковые и платяные вши, клещи чесоточные	12,0 мл

дезинсекция помещений против вшей и чесоточных клещей: Обрабатывают все предметы, с которыми мог контактировать больной или соприкасались зараженные паразитами вещи: пол, стулья, кушетки и пр. Пол орошают из распыливающей аппаратуры. Другие поверхности протирают или орошают рабочим раствором. Норма расхода составляет 30-50 мл/кв.м в зависимости от типа поверхности (невпитывающая/впитывающая влагу).

приготовление рабочей эмульсии для дезинсекции помещений (на 1 л воды):

Объект обработки	Кол-во средства
дезинсекция помещений от вшей и чесоточных клещей	12,0 мл

меры предосторожности: обработку проводить при открытых окнах, используя средства индивидуальной защиты (очки, респиратор, халат или комбинезон, косынка, клеенчатый или прорезиненый фартук, и нарукавники, резиновые перчатки). На время проведения обработки убрать (тщательно укрыть) продукты питания и пищевую посуду, удалить из помещения животных, птиц, закрыть аквариумы. Лекарственные препараты и инструменты убрать в шкаф. Во время работы запрещается пить, курить и принимать пищу. По окончании работ принять душ и проветрить помещение (не менее 30 мин). Спецодежду снять и проветрить. При попадании средства в глаза – тщательно промыть их водой. При появлении раздражения слизистой оболочки – закапать в глаза 30% сульфацил натрия, при болезненности – 2% раствор новокаина; при загрязнении кожи – снять капли эмульсии ватным тампоном, не втирая, затем вымыть загрязненный участок водой с мылом. При случайном попадании средства в желудок – необходимо выпить 1-2 стакана воды с измельченным активированным углем (10-15 таб. на стакан воды). Не вызывать рвоту и ничего не вводить в рот человеку, потерявшему сознание. После оказания первой помощи пострадавший должен обратиться к врачу.

III-IV класс умеренно и малоопасных веществ.

хранение: хранить средство следует в сухом, темном, закрытом складском помещении в закрытой упаковке, при температуре не ниже -20°С и не выше +40°С, вдали от источников огня и солнечного света, отдельно от лекарственных средств и пищевых продуктов в недоступном для детей месте.

Срок годности - 2 года

ТУ № 9392-016-16964697-2008
Свидетельство гос. регистрации:
№ RU.77.99.88.002.E.004325.03.11

НП ЗАО РОСАГРОСЕРВИС
125464, Россия, Москва, Пятницкое ш., 14
(495) 799 9439, www.rosagroservis.ru