

ИНСТРУКЦИЯ
по применению инсектоакарицидного средства
«Мухомор Экстра»

ИНСТРУКЦИЯ

по применению инсектицидного средства «Мухомор Экстра»

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Инсектицидное средство «Мухомор Экстра» (НП ЗАО «Росагросервис», Россия, Москва) представляет собой пищевую приманку в виде порошка или гранул желтого цвета. В качестве действующего вещества средство содержит зета-циперметрин из группы пиретроидов, а также цис-трикозен – половой феромон мух, который – обеспечивает привлечение насекомых к гранулам. Наличие в составе сахара способствует охотному длительному контакту мух с приманкой, а горький компонент битрекс защищает ее от поедания птицами и домашними животными.

1.2. Инсектицидное средство «Мухомор Экстра» обладает острым инсектицидным действием по отношению к имаго мух и сохраняет свою активность в течение 2-3 месяцев.

1.3. По параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 при однократном введении в желудок и нанесении на неповрежденные кожные покровы относится к IV классу малоопасных средств. Пары в условиях насыщающих концентраций малоопасны - IV класс опасности по Критериям отбора средств дезинсекции. По лимитирующему критерию вредности - зоне острого и подострого биоцидного действия пары в соответствии с Классификацией степени опасности средств дезинсекции относятся к IV классу малоопасных веществ ($Zac.bios.ef.$; $Zsubac.. > 100$). При однократном нанесении и многократных (10) аппликациях на неповрежденную кожу крыс и кроликов местно-раздражающего действия не выявлено. Сенсибилизирующий и кожно-резорбтивный эффекты отсутствуют.

ПДК зета-циперметрина в воздухе рабочей зоны – $0,5 \text{ мг/м}^3$ (II класс опасности).

1.4. Инсектицидное средство «Мухомор Экстра» предназначено для уничтожения мух на объектах различного типа, включая лечебные, детские, пищевые с соблюдением правил расстановки приманки и постоянным контролем за ее состоянием (отсутствие рассыпанных гранул или порошка и нахождение их вне приманочной станции, количество съеденной приманки, загрязнение поверхностей и т.п.). При наличии на объектах детей раскладку приманки следует производить с особой осторожностью, не привлекая их внимания и размещать ее в тех местах, которые для них труднодоступны. Средство рекомендовано для применения персоналом организаций, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью, и населением в быту.

2. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

2.1. Для уничтожения имаго мух порошок или гранулы раскладывают на подложки (крышка, блюдце, которые не используются как пищевые) из расчета $2,5 \text{ г}$ на 1 приманочную станцию, рассчитанную на площадь 1 м^2 .

2.2. Расставляют приманочные станции в местах наибольшего скопления мух: около разделочных столов в ресторанах, кафе, столовых, местах приготовления пищи, фасовки, развешивания, на кухнях квартир жилых домов, на террасах и т.п.

2.3. Подложку с приманкой в течение периода ее действия можно переставлять в другие места, располагая там, где наблюдается наибольшая численность мух.

2.4. Порошок и гранулы можно смачивать водой до образования пасты, которую наносят на места возможной посадки мух: стыки рам, дверные перегородки, оконные стекла и т.д.

2.5. Повторные обработки проводят по энтомологическим показаниям: при скоплении мух или постоянном залете их в помещения.

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

3.1. Раскладывать приманки в лотках или на специальных не пищевых подложках следует осторожно, размещая их так, чтобы они не попали в поле зрения детей.

3.2. Не допускать контакта средства с незащищенной кожей рук.

3.3. При многократном использовании - более одной упаковки в день - рекомендуется защищать кожу рук резиновыми перчатками.

3.4. Использовать средство только по назначению.

3.5. Защищать приманку от воздействия влаги и прямых солнечных лучей.

4. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ

4.1. При нарушении рекомендуемых мер предосторожности может произойти отравление, при котором пострадавшего следует вывести на свежий воздух.

4.2. При случайном попадании средства на слизистую оболочку глаз или на кожу обильно обмыть их водой

4.3. При случайном попадании средства в желудок необходимо выпить несколько стаканов воды и вызвать рвоту, а затем выпить 1-2 стакана воды со взвесью активированного угля (10-15 таблеток). При необходимости обратиться к врачу. Лечение симптоматическое.

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ, УПАКОВКА

5.1. Транспортирование допускается всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, с классификационным шифром 6112, № ООН 2588. При случайном россыпе порошка или гранул собрать их совком, а загрязненное место вымыть водой с мылом.

5.2. Хранить в сухом проветриваемом крытом складском помещении в закрытой таре при температуре не ниже минус 10°C и не выше плюс 40°C. В условиях быта – отдельно от пищевых продуктов, в местах, не доступных для детей и домашних животных.

5.3. Упаковывается средство по 10-50 г в герметично заваренные пакеты из многослойной полимерной пленки или кашированной фольги; по заказу – от 1 кг и более – в мешки, в пластиковые ведра.

5.4. Срок годности: 3 года в невскрытой упаковке изготовителя.

6. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЙ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

Нормируемые показатели по Техническим условиям:

Внешний вид – порошок или гранулы желтого цвета.

Массовая доля зета-циперметрина – $0,050 \pm 0,001\%$

6.1. Внешний вид и цвет средства определяют визуальным осмотром пробы.

6.2. Измерение массовой доли зета-циперметрина.

Методика измерения массовой доли зета-циперметрина основана на методе газожидкостной хроматографии с применением детектора по захвату электронов, изотермического разделения компонентов на неподвижной фазе SE-30 после экстракции ацетоном.

